# 7일만에 끝내는 간호사 국가고시

※ 정오 및 오탈자를 수정합니다. 앞으로 더욱더 좋은 양서를 만들 수 있도록 꾸준히 노력할 것을 약속드립니다.

| 페이지 | 오 | 정 |
|---|---|---|
| p16 | 14. 정답 ① | 14. 정답 ①,② |
| p25 | 71. ⑤ 여성의 일생을 통한 전 연령층의 **여성** 건강관리를 한다. | 71. ⑤ 여성의 일생을 통한 전 연령층의 **여성 만을** 관리한다. |
| | 73. ② 성교 후 72시간 내에 복용해야 한다. | 73. ② 성교 후 72시간 내에 **1회** 복용한다. |
| p30 | 9. 정답 ③ | 9. 정답 ② |
| p44 | 7. 정답 ④ | 7. 정답 ④, ⑤ |
| p68 | 7. 부모가 신생아를 옆으로 누일 때 몸의 **아랫**부분이 창백해진다고 걱정할 때 간호사의 반응으로 적절한 것은? | 7. 부모가 신생아를 옆으로 누일 때 몸의 **윗**부분이 창백해진다고 걱정할 때 간호사의 반응으로 적절한 것은? |
| p219 | 47. ⑤ **재호흡** 마스크 | 47. ⑤ **재호흡방지** 마스크 |
| p274 | 83. ⑤ **직접**적으로 질문하여 확인한다. | 83. ⑤ **간접**적으로 질문하여 확인한다. |
| p252 | 2. 보기 정정<br>⑤ 종이봉투를 사용하여 내쉰 숨을 다시 마시도록 한다. | ⑤ **기관지 확장제를 투여하고 절대 안정한다.** |
| p301 | 9. 정답 ③ | 9. 정답 ② |
| p301 | 21. 정답 ④ | 21. 정답 ④, ⑤ |
| p322 | 64. 해설 정정<br>문제에 제시된 증상은 **저칼륨**혈증 시 나타나는 증상들이다. | 64. 해설 정정<br>문제에 제시된 증상은 **저칼슘**혈증 시 나타나는 증상들이다. |
| p420 | 47. 해설 정정<br>**재호흡마스크**로 유속 15L/분 까지 줄 수 있으며 최대 $FiO_2$ **80%**까지 유지될 수 있다. | 47. 해설 정정<br>**재호흡방지마스크**로 유속 15L/분 까지 줄 수 있으며 최대 $FiO_2$ **80~100%**까지 유지될 수 있다. |